


Kitűtetés után minden tavasszal visszametszzük ezen anyá-
tökék venyigéit 1—2 szemre, hogy azokból minél több, de

9. ábra.



tási mód mellett minden második évben számíthatunk kat. hol-
dankint 25—30.000 gyökéres vesszőre; de az ily telep minden
2—3-ik évben erősen kell hogy trágyáztassék, különben kimerül.
Ezen eljárásnál a körbujtás annyival tökéletesebb, mert a
töke sem gyengítették annyira és mert a körbujtásról minden
évben szedhetünk bizonyos számú gyökéres vesszőt. Ily körbuj-
tásra való állandó telepet a következőleg rendezhetünk be. Jó
erőteljes, ha lehet, iszapos talajban készünk minden 150 cm.-re
négyzetben egy 60 cm. átmérőjű s ugyanolyan mely gödröt, melybe
egy jó erős gyökéres vesszőt tűtetünk az elszaporítási számdékol-
tásnál. Az tűtetésnél esetleg jobb talajt is használhatunk a gödör
kitöltésére, sőt alul a gödör ágát csomolisztt és hamuval kevert
komposzttrágyával vethetjük meg.

ami
ban
juk,
(nk.)
itás-
nden
5—6
emre
fel-
2—3
5—6
yen.
hogy
zunk
yigét
fejtet
sapr
ével,
ellett
be-
tötött
gyö-
kell
erése
ki-
mleg
knál,
adag
pasz-
k is,
nem